

# Herbicida

# Podium®

Herbicida residual

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Concentrado para emulsão (EC) c/ 34% (p/p) ou 330 g/L de pendimetalina

Família química: Dinitroanilina

Número de AV: 0330

Classificação ADR: 1993, 3, III

Embalagem: 100 mL, 500 mL, 1 L, 5L e 20 L



PERIGO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **PODIUM®** é um herbicida residual e de contacto com absorção radicular e absorção pelas gemas em desenvolvimento.
- **PODIUM®** inibe a divisão celular ao nível da mitose, atuando nos meristemas apicais e radiculares; impede a formação dos microtúbulos.
- **PODIUM®** controla seletivamente espécies herbáceas anuais, de folha larga e folha estreita, em diferentes culturas.
- As plantas afetadas morrem rapidamente após a germinação.

## OBSERVAÇÕES

- O solo deve estar bem preparado, sem torrões e com humidade suficiente, na altura de aplicação de **PODIUM®**.
- As doses mais baixas deverão ser utilizadas em solos de textura ligeira e as mais altas em solos de textura mais pesada.



ASCENZA®

| CULTURA  | DOSE (kg/ha) | ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO   |
|--|--------------|--|
| BATATEIRA  | 4-6          | Aplicar em pré-emergência da cultura após efetuar uma amontoa.   |
| CEBOLA   |              | Aplicar em pré ou pós-emergência das infestantes ou em pré ou pós-transplante da cultura.  |
| MILHO  |              | Aplicar em pré ou pós-emergência da cultura.   |
| TOMATEIRO  |              | Aplicar antes ou após o transplante da cultura.  |
| ALHO   |              | Aplicar em pré-emergência ou pós-emergência precoce.   |
| CENOURA, ERVILHEIRA, FEJÓEIRO, FEIJÃO-VERDE, GIRASSOL, FAVEIRA, GRÃO-DE-BICO |              | Aplicar em pré-emergência da cultura.  |
| COUVES (couves-de-repolho e couve-portuguesa)                                |              | Aplicar em pré-plantação.  |
| TABACO   |              | Aplicar em pré-plantação.  |
| PIMENTEIRO   |              | Aplicar em pré-plantação.  |
| MORANGUEIRO  |              | Aplicar em pré-plantação. A aplicação deve ser feita entre os camalhões, no fim do repouso vegetativo, em tratamento dirigido ao solo. |

### INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Beldroega (*Portulaca oleracea*), bredo (*Amaranthus blitoides*), catassol (*Chenopodium album*), corriola- bastardia (*Fallopia convolvulus*), couve-maltesa (*Chenopodium opulifolium*), erva-das-verrugas (*Heliotropium europaeum*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), mal-casado (*Polygonum lapathifolium*), milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*), moncos-de-peru (*Amaranthus retroflexus*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), urtiga-menor (*Urtica urens*), urtiga-morta (*Mercurialis annua*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*)

### INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Erva-moira (*Solanum nigrum*), milhã pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), milhãs (*Setaria spp.*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*)

### INFESTANTES RESISTENTES

Corriola (*Convolvulus arvensis*), erva-leiteira (*Euphorbia helioscopia*), ésula-menor (*Euphorbia exigua*), figueirado-inferno (*Datura stramonium*), graminhão (*Paspalum paspalodes*), grama (*Cynodon dactylon*), junça (*Cyperus rotundus*), juncinha (*Cyperus esculentus*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*)

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Na cultura de tomateiro e tabaco após a aplicação do herbicida este deverá ser incorporado no solo com uma mobilização superficial de 5 a 8 cm ou com uma rega ligeira
- Nas restantes culturas desde que não chova nos 7 dias após a aplicação, deverá ser feita uma rega; não mobilizar o solo
- Culturas sensíveis a este herbicida: beterraba, acelga, melão, pepino e espinafre
- Após a aplicação de **PODIUM®** não semear milho, melão, pepino ou outras cucurbitáceas, alface, espinafre ou beterraba antes de decorridos 6 meses
- Não instalar qualquer outra cultura antes de decorridos 3 meses após a aplicação de **PODIUM®**
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura