

Fungicida

Lousal®

Fungicida sistêmico de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Emulsão água em óleo (EW) c/ 25,5% (p/p) ou 250 g/L de tebuconazol

Família química: Triazol

Número de AV: 1660

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 20 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- LOUSAL® é um fungicida sistêmico indicado para o controlo do oídio da videira, olho de pavão da oliveira, e doenças do trigo e cevada
- LOUSAL® penetra rapidamente no interior das folhas (2 horas) proporcionando resistência à lavagem, seguindo-se uma migração lenta e regular no interior da planta, possibilitando a proteção dos novos tecidos

OBSERVAÇÕES

- A utilização do LOUSAL® no controlo do olho de pavão em olival, permite o combate a esta doença ao seu aparecimento e em condições climáticas favoráveis, com a aplicação Primavera
- Se necessário, prosseguir os tratamentos no Outono com produtos cúpricos aprovados para a finalidade sendo que se poderá recorrer à estratégia cúprica preventiva no Outono com o CUPRITAL®, CUPRITAL® SC ou outro dos nossos cobre.

ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	CONC. (mL/hL)	DOSE (L/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
TRIGO	Ferrugem Amarela, Ferrugem Castanha, Oídio e Septoriose	-	1	Ao aparecimento dos sintomas. Se necessário repetir após 2 a 3 semanas.	35
CEVADA	Ferrugem Castanha, Helmintosporiose, Oídio e Rincosporiose				
VIDEIRA	Oídio	40	0,4	Iniciar as aplicações aos cachos visíveis. Repetir a intervalos de 14 dias num máximo de 3 aplicações com este ou outro DMI, posicionadas antes do fecho dos cachos.	14
OLIVEIRA	Olho de Pavão (<i>Spilocaea oleagina</i>)	60	0,6	Na Primavera ao surgimento da doença e em condições climáticas favoráveis. Repetir se necessário após 2 a 4 semanas num máximo de 2 tratamentos (com este ou outro DMI).	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Seguir as recomendações do Serviços de Avisos
- Calibrar adequadamente o equipamento de aplicação. A concentração de produto deve ser ajustada à quantidade de água distribuída por hectare, pelo pulverizador, de modo a não exceder as doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento de calda, evitar pressões superiores a 2 kg/cm² e o uso de atomizadores. Aplicar em condições de pouco vento
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Videira / oídio



Oliveira / olho-de-pavão



Cereais / ferrugem

