

Inseticida

Tenor[®] SC

Acaricida específico

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Suspensão concentrada (SC) com 257 g/L ou 24 % (p/p) de hexitiazox

Família química: Tiazolidinona

Número de APV: 1489

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 250 mL e 1 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **TENOR[®] SC** é um acaricida que atua por contacto e ingestão, no controlo de formas jovens de ácaros tetraniquídeos nas culturas de macieira, pereira, laranjeira, tangerineira, limoeiro, lima, videira e ornamentais florais ou de flor. É um regulador de crescimento de ácaros, atuando como inibidor de crescimento.
- Possui um excelente efeito de choque e elevada persistência de ação.

OBSERVAÇÕES

- Inibidor das síntese de quitina em todos os estados do ciclo biológico (ovos e larvas).
- Ação esterilizante das fêmeas adultas.
- Molhar bem toda a folhagem.
- Utilizar um volume de calda: Videira e Ornamentais de flor: 500-1000 L/ha; Macieira e Pereira: 800-1000 L/ha; Laranjeira, Tangerineira, Limoeiro e Lima: 1000-2500 L/ha.

ASCENZA[®]

CULTURA	PRAGAS	CONC. (g/hL)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA	Aranhico-amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>)	20-30 mL/hL	Aplicar no início da primavera à eclosão dos ovos de inverno dos ácaros (geralmente do abrolhamento até à floração) ou ao aparecimento das suas primeiras formas móveis.	21
MACIEIRA E PEREIRA	Aranhico-amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>) Aranhico-vermelho (<i>Panonychus ulmi</i>)	20-30 mL/hL		28
LARANJEIRA, TANGERINEIRA, LIMOEIRO E LIMA	Aranhico-amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>) Aranhico vermelho-dos-citrinos (<i>Panonychus citri</i>)	4-6 mL/hL	Aplicar ao aparecimento das primeiras formas móveis dos ácaros.	14
ORNAMENTAIS DE FLOR	Aranhico-amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>) Aranhico vermelho-dos-citrinos (<i>Panonychus citri</i>)	20 mL/ hL		-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

