

Herbicida

Deflexo[®] Plus

Um Plus no controlo das infestantes

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Suspo-emulsão (SE) com 40 g/L ou 3,73% (p/p) de mesotriona e 400 g/L ou 37,33% (p/p) de S-metolacloz

Família química: cloroacetanilida e ciclohexanodiona

Número de AV: 2004

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1 L, 5 L e 20L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- DEFLEXO[®] PLUS é um herbicida sistémico, com ação residual.
- DEFLEXO[®] PLUS pode ser aplicado em pré-emergência (evitando as novas germinações) ou pós-emergência precoce das infestantes e da cultura.
- Está indicado para o controlo de infestantes gramíneas e de folha larga em milho.
- Apresenta absorção foliar e radicular.
- Inibe a biossíntese de carotenóides (inibindo a atividade da enzima 4-hidroxiifenil-piruvato-dioxigenase, 4-HPPD) e a divisão celular.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

GRAMÍNEAS: milhã-digitada (*Digitaria sanguinalis*); milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*); pega-saias (*Setaria verticillata*); milhã-verde (*Setaria viridis*).

DICOTILEDÓNEAS: moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*); figueira-do-inferno (*Datura stramonium*); tasneiriinha (*Senecio vulgaris*); erva-moira (*Solanum nigrum*); verónica-dos-campos (*Veronica arvensis*); breido-perene (*Amaranthus deflexus*); breido-vermelho (*Amaranthus hybridus*); catassol (*Chenopodium album*); lâmio-roxo (*Lamium purpureum*); erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

GRAMÍNEAS: junça-de-conta (*Cyperus rotundus*); alcarache (*Paspalum distichum*).

DICOTILEDÓNEAS: corriola-grande (*Calystegia sepium*).

ASCENZA[®]

CULTURA	ALVO	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	INTERVALO DE SEGURANÇA
MILHO	Infestantes gramíneas e dicotiledóneas anuais	3 L/ha	Aplicar em pré-emergência e pós-emergência precoce da cultura do milho, desde o aparecimento da primeira folha emergente do coleóptilo até às 4 folhas abertas (BBCH 10-14) e com as infestantes no início do seu desenvolvimento.	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A existência de humidade no solo facilita a ação deste herbicida. Se não se prever chuva nos primeiros dias após a aplicação, deverá ser feita uma rega. Após a aplicação do herbicida, não se deverá mexer na terra.
- Volume de calda a utilizar: 200-600 L/ha.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.