

Inseticida

Delstar[®]

Inseticida piretróide de amplo espectro de ação

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Concentrado para emulsão (EC) c/ 2,8% (p/p) ou 25 g/L de deltametrina

Família química: Piretróide

Número de AV: 0405

Classificação ADR: 1993, 3, III

Embalagem: 30 mL, 500 mL, 1 L e 5L



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- DELSTAR[®] é um inseticida de contato, à base de deltametrina, pertencente ao grupo dos piretróides, que atua ao nível do sistema nervoso dos insetos, impedindo a transmissão dos impulsos nervosos
- DELSTAR[®] tem um efeito letal sobre as formas ativas dos insetos
- Apresenta uma elevada lipofilidade, essencial para uma aderência à cutícula dos insetos

OBSERVAÇÕES

- DELSTAR[®] tem ação repelente sobre os insetos, ajudando a prevenir novos ataques

CULTURA	DOENÇA	CONC. (mL/hL)	DOSE (mL/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
BATATA	Escaravelho	30 - 50	300 - 500	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade, não excedendo 3 aplicações.	7
TOMATE	Logartas Mosca branca das estufas			Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade com intervalos de 3 semanas, não excedendo 3 aplicações.	3
MAÇEIRA PEREIRA	Bichado da fruta	30 - 50	300 - 500	Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua ausência aplicar a partir de meados de maio, com intervalos de 15 dias. Não realizar mais de 3 aplicações por ciclo cultural.	7
	Afídeos especialmente piolho verde			Aplicar ao aparecimento da praga, molhando bem todas as partes verdes da árvore. Repetir em caso de necessidade. Se existirem infestações com enrolamento das folhas, recorrer a um inseticida sistémico. Não realizar mais de 3 aplicações por ciclo cultural.	
PEREIRA	Psila	75	750	Tratar ao aparecimento da praga molhando todos os órgãos da planta. Repetir o tratamento se necessário.	7
PESSEGUIRO DAMASQUEIRO AMEXEIRA CEREJEIRA	Afídeos especialmente piolho verde do pessegueiro	30 - 50	300 - 500	Aplicar ao aparecimento da praga, molhando bem todas as partes verdes da árvore. Repetir em caso de necessidade. Se existirem infestações com enrolamento das folhas, recorrer a um inseticida sistémico. Não realizar mais de 3 aplicações por ano cultural.	7
CEREJEIRA	Mosca da cereja			Tratar após o aparecimento da praga repetindo se necessário, não excedendo as 3 aplicações.	
COUVES	Logartas, Nóctuas			Aplicar ao aparecimento da praga e repetir o tratamento em caso de necessidade.	
ALFACE	Nóctuas			Tratar após a instalação da cultura pulverizando a planta junto ao solo que fica junto à planta.	3
VINHA	Cicadela	30 - 50	300 - 500	A aplicação deve ser feita quando se encontrarem 100 larvas em 100 folhas e a partir de julho quando houver 50 larvas em 100 folhas.	7
	Traça da uva	40 - 60	400 - 600	Efetuar os tratamentos de acordo com os Serviços de Avisos; na sua ausência fazer o primeiro tratamento antes da floração (1ª geração) e o segundo antes do estado bogo de evilha (2ª geração).	
	Álrica	30 - 50	300 - 500	Tratar ao aparecimento da praga repetindo o tratamento se necessário.	
CEREAIS DE INVERNO	Logarta de sete-coiros Afídeos	-	300	Aplicar ao aparecimento da praga	30
MILHO	Nóctuas	-	300	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade, tendo em atenção um intervalo de 14 dias entre aplicações.	
	Piral	-	500	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir em caso de necessidade, tendo em atenção um intervalo de 14 dias entre aplicações.	
OLIVAL	Mosca da azeitona Traça da oliveira	40 - 60	400 - 600	Aplicar ao aparecimento da praga. Repetir o tratamento em caso de necessidade, respeitando um intervalo de 14 dias entre aplicações. Não realizar mais de 3 aplicações por ano cultural.	7
AVELEIRA	Afídeos	50	500	Aplicar ao aparecimento da praga, repetindo o tratamento em caso de necessidade, respeitando um intervalo de 14 dias entre aplicações.	30
ORNAMENTAIS				Aplicar ao aparecimento da praga, repetindo o tratamento em caso de necessidade, respeitando um intervalo de 14 dias entre aplicações.	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- DELSTAR® não deve ser misturado com produtos alcalinos
- Não aplicar o produto diretamente sobre flores de ornamentais
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Tomate / logarta

escaravelho / mosca branca

