

Fungicida

Fox® WG Advance

Fungicida sistêmico de amplo espectro

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) c/ 25% (p/p) de tebuconazol

Família química: Triazol

Número de APV: 3849

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 400 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **FOX® WG ADVANCE** é um fungicida sistêmico de amplo espectro para o controle do pedrado das pomóideas, da estenfiliose da pereira e do oídio da macieira e da videira
 - Apresenta atividade preventiva de 7-8 dias, tendo uma capacidade curativa de cerca de 3 dias
- Após a aplicação:
- o produto penetra rapidamente no interior da folha (2 horas), proporcionando resistência à lavagem,
 - a que se segue uma migração lenta e regular no interior da planta - proteção dos novos tecidos

Pela sua formulação, o **FOX® WG ADVANCE** apresenta:

- Ausência de pó
- Maior segurança para o aplicador
- Elevada homogeneidade das partículas
- Fácil de medir e de limpar
- Molha-se e mistura-se rapidamente
- Excelente dispersão e suspensão em água
- Não é necessário realizar uma pré-calda
- Estabilidade em armazém



ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
MACIEIRA E PEREIRA	Pedrado	30 - 40	0,3 - 0,4	Quando o tempo decorra húmido ou chuvoso realizar os tratamentos ao aparecimento da ponta verde das folhas, ao botão rosa ou botão branco, à queda das pétalas e ao vingamento dos frutos.	21
MACIEIRA	Oídio	40	0,4	Realizar o primeiro tratamento ao abrolhamento.	
PEREIRA	Estenfiliose	75	0,75	Realizar as aplicações preventivamente desde o vingamento até à colheita, sempre que se verifiquem condições favoráveis ao desenvolvimento da doença.	
VINHA	Oídio	40	0,4	As aplicações devem ser efetuadas a partir dos cachos visíveis, a intervalos máximos de 2 semanas.	14

OBSERVAÇÕES

- Considerando a prática de uma estratégia mista, determinante em anos de grande heterogeneidade dos pomares, **FOX® WG ADVANCE** é uma ótima solução para utilizar conjuntamente com s.a. de características predominantemente preventivas, como é o caso do mancozebe.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos
- **FOX® WG ADVANCE** pode ser aplicado em estreme, em mistura ou em alternância com s.a. de características predominantemente preventivas, como o mancozebe, entre outros. Deve respeitar-se sempre a dose recomendada
- Em macieiras e pereiras, efetuar no máximo 4 aplicações por ciclo vegetativo da planta com soluções do grupo dos IBE's (Inibidores da Biosíntese do Ergosterol)
- Em vinha realizar um máximo de 3 tratamentos por ciclo cultural, posicionados antes do fecho dos cachos, com este ou outro fungicida do grupo dos IBE's. Os restantes tratamentos devem ser efetuados com **STULLN®** ou **STULLN® WG ADVANCE**
- Não se deve aplicar **FOX® WG ADVANCE** onde se comecem a verificar quebras de eficácia após aplicações repetidas de IBE's
- As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura



Macieira / oídio / pedrado



Pereira / estenfiliose


ASCENZA®