

Fungicida

Bago de Ouro®

98,5%

Fungicida anti-oidio com ação acaricida

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó polvilhável (DP) c/ 98,5% (p/p) de enxofre

Família química: Inorgânico

Número de APV: 4015

Classificação ADR: 1350, 4.1, III

Embalagem: 5 kg e 25 kg

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Bago de Ouro® 98,5%** é um fungicida anti-oidio com ação acaricida. Atua por contacto e garante uma excelente proteção graças à libertação na forma de vapor
- **Bago de Ouro® 98,5%** tem ação preventiva e curativa sobre o oídio
- O enxofre é ativo a partir dos 18° C, não sendo conveniente a aplicação a temperaturas superiores a 28° C, pois pode ser fitotóxico. Abaixo dos 20° C é aconselhável aplicar anti-oidios de síntese
- A ação acaricida de **Bago de Ouro® 98,5%** permite atenuar acaríoses diversas, em particular a erinose
- A libertação de vapores provoca um aumento de temperatura que tem um papel benéfico na fase de floração - vingamento

CULTURA	DOENÇA/PRAÇA	DOSE (kg/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
ABÓBORA ERVILHEIRA MELOEIRO PEPINO TOMATEIRO	Oídio	10-50	Iniciar as aplicações quando as plantas apresentam 3-5 folhas definitivas. Repetir a intervalos de 2-3 semanas.	-
VIDEIRA			Nos casos normais considera-se possível manter um controlo satisfatório do oídio mediante três aplicações fixas de enxofre em pó respetivamente quando os cachos se encontram visíveis, na floração/alimpa e com os bagos do tamanho de grão de ervilha. Sempre que surjam focos de oídio proceder a tratamentos localizados.	-

CULTURA	DOENÇA	DOSE (kg/ha)	ALARGAMENTO DE ESPECTRO PARA USOS MENORES	IS (dias)
BANANEIRA	Aranhão vermelho	10-20	Tratar nos meses mais quentes e com humidade baixa, repetindo se necessário. (máx. 3 aplicações)	5
PAPAEIRA	Oídio da papoeira	50	Iniciar os tratamentos ao aparecimento dos primeiros sintomas na rebentação das folhas, flores e frutos, repetindo se necessário. (máx. 4 aplicações)	
BATATA-DOCE	Mosca-branca	10-50	Tratar ao início do ataque. Polvilhagem dirigida às folhas. Intervalo entre aplicações 15 a 21 dias. (máx. 3 aplicações)	-
CEREJEIRA	Larva-lesma	10-50	Tratar ao aparecimento dos primeiros sintomas, na primavera, verão e outono. Polvilhagem dirigida à copa da árvore. Intervalo entre aplicações 15-21 dias. (máx. 3 aplicações)	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico
- Seguir as recomendações dos Serviços de Avisos
- Pode provocar sintomas de fitotoxicidade em cucurbitáceas, com destaque para abóbora, pepino e melão
- Não se deve aplicar quando as folhas se encontrem molhadas por chuva ou orvalho
- Não aplicar óleos minerais durante os 21 dias anteriores ou posteriores a um tratamento com enxofre
- Produto utilizável em Modo de Produção Biológico, de acordo com a legislação. Para qualquer esclarecimento adicional poderá consultar a lista de produtos no site www.ecocert.com
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura

