

Herbicida

Orbiter®

Herbicida de cereais anti-dicotiledóneas

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Suspensão concentrada (SC) c/ 50g/L ou 4,95% (p/p) de florasulame

Família química: triazolopirimidinas

Número de AV: 1572

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1 L



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **ORBITER®** é absorvido por via foliar e radicular e é distribuído pela planta através do xilema e floema atingindo os tecidos apicais.
- Produto indicado para o controle das infestantes dicotiledóneas, em pós-emergência.
- Uma vez aplicado e absorvido, o **ORBITER®**, é rapidamente transportado até aos pontos de crescimento da planta - rebentos e extremidades radiculares - onde inibe o seu desenvolvimento. Consequentemente, as infestantes morrem, perdendo desde logo a capacidade de competir com a cultura pela água e nutrientes.

CULTURA	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
TRIGO MOLE E DURO	80-150 mL/ha	Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 3 folhas e o 2º nó (BBCH 13-32) e após a emergência das infestantes (nas primeiras fases de desenvolvimento). Nas aplicações de outono utilizar a dose de 80 mL/ha. Nas aplicações de primavera utilizar a dose de 150 mL/ha.
CEVADA		Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 3 folhas e o início do embaralhamento (BBCH 13-39) e após a emergência das infestantes (nas primeiras fases de desenvolvimento). Nas aplicações de outono utilizar a dose de 80 mL/ha. Nas aplicações de primavera utilizar a dose de 150 mL/ha.
TRITICALE		Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 3 folhas e o 2º nó (BBCH 13-32) e após a emergência das infestantes (nas primeiras fases de desenvolvimento). Nas aplicações de outono utilizar a dose de 80 mL/ha. Nas aplicações de primavera utilizar a dose de 150 mL/ha.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Morrião (*Anagallis arvensis*), amor-de-hortelão (*Gallium aparine*), camomila (*Matricaria chamomilla*), papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), sempre-noiva (*Polygonum aviculare*), saramago (*Raphanus raphanistrum*), morugem-branca (*Stellaria media*).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-se proceder, sempre que possível, a alternância de herbicidas com modo de ação diferente.
- Volume de calda a utilizar: 200 a 400 L/ha.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.