

# Prevatect®

Cloridrato de quitosano - 50 g/L em suspensão concentrada (SC)

## A BARREIRA NATURAL

### CARACTERÍSTICAS

**Prevatect®** é um produto natural para utilização em agricultura biológica e convencional na prevenção e indução de defesas naturais contra a podridão cinzenta (*Botrytis cinerea*).

Composto por quitosano, esta substância é obtida a partir da quitina de crustáceos e do exoesqueleto de moluscos com um efeito indutor do mecanismo de defesa natural das plantas contra ataques de bactérias e fungos.



CULTURA	MODO DE AÇÃO	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	TIPO DE APLICAÇÃO	Nº DE APLIC.	INTERVALO DE APLICAÇÃO	DOSE/ CONC.	VOL. CALDA (l/ha)
VINHA E PEQUENOS FRUTOS	Promotor do mecanismo de defesa natural das plantas	A partir do desenvolvimento da primeira folha até ao desenvolvimento do fruto	Pulverização de baixo-médio volume	4-8	2 semanas	2-4 l/ha	200-400
HORTÍCOLAS							
CEREAIS							
PLANTAS ORNAMENTAIS							
PLANTAS FORRAGEIRAS	Promotor do mecanismo de defesa natural das plantas	Antes da sementeira	Pulverização de baixo volume/imersão	1	Não aplicável	1-2 l/ha	Não aplicável
CEREAIS (tratamento de semente)						1-2 l/ha	Não aplicável
BATATA (tratamento de semente)						1-2 l/ha	Não aplicável
BETERRABA SACARINA (tratamento de semente)						1-2 l/ha	Não aplicável
PLANTA ORNAMENTAL BULBOSA	Promotor do mecanismo de defesa natural das plantas	Germinação (BBCH 00-01)	Tratamento de imersão	1	Não aplicável	2-4 l/ha	200-800
BETERRABA		Desenvolvimento das folhas - senescência (BBCH 10-92)	Pulverização de baixo-médio volume	1-8	5-7 dias	2-4 l/ha	200-400

PREVATECT® marca registada pela ASCENZA PORTUGAL.