

# Fungicida

# Spyrit® C

Fungicida anti-míldio com cobre e ação anti-esporulante

**Tipo de produto:** Fungicida

**Composição:** Pó molhável (WP) c/ 40% (p/p) de cobre (na forma de oxiclureto de cobre) + 6% (p/p) de dimetomorfe

**Família química:** Morfolina e inorgânico

**Número de AV:** 0798

**Classificação ADR:** 3077,9,III

**Embalagem:** 300 g e 12 kg



ATENÇÃO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **SPYRIT® C** é um fungicida que contém na sua composição duas substâncias ativas (s.a.): dimetomorfe e cobre (na forma de oxiclureto de cobre). O dimetomorfe é um fungicida derivado do ácido cinâmico (CAA), que inibe a síntese da celulose; tem ação preventiva, curativa (sobre as infecções de míldio na sua fase inicial) e uma importante ação anti-esporulante. O cobre é um fungicida de superfície, "multi-site", que inibe vários processos metabólicos
- **SPYRIT® C** interfere em diferentes processos do metabolismo do fungo, nomeadamente no bloqueio de diferentes fases de formação da membrana celular, síntese de proteínas e lipídios e, ainda, inibindo a produção de energia
- Após a aplicação, **SPYRIT® C** reparte-se entre a superfície foliar e o interior da planta, tornando-se resistente à lavagem uma hora após o tratamento
- **SPYRIT® C** é um fungicida com versatilidade de aplicação, mas a presença do cobre na sua formulação, torna-o particularmente interessante para ser aplicado numa fase mais próxima do final do ciclo, promovendo o endurecimento da película dos bagos, atempamento das varas e ajudando na cicatrização de feridas provocadas por eventuais intervenções em verde

ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
VINHA	Mildio ( <i>Plasmopara viticola</i> )	250-300	2,5-3	Efetuar os tratamentos de acordo com as indicações do Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença, iniciar os tratamentos desde as 8 folhas livres até ao início do fecho dos cachos.	28

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O intervalo entre aplicações deve ser de 10 a 12 dias.
- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não efetuar com este ou com outro fungicida do grupo CAA, mais de 3 tratamentos por ciclo cultural
- A quantidade do produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as doses indicadas
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura

