

Herbicida

Kacik[®]

Herbicida sistêmico, contato e residual

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 400 g/kg de diflufenicão, 20 g/kg de florasulame e 46,6 g/kg de iodossulfurão (na forma de sal de sódio do éster metílico)

Família química: piridinocarboxamida + triazolopirimidina + sulfonilureia

Número de AV: 0973

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 1 kg



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Herbicida para controle de infestantes em cereais de Inverno e Primavera
- Herbicida com ação de contato, residual e sistêmico
- Largo espectro de ação sobre infestantes (folha larga e estreita)
- Elevada segurança para operadores e ambiente
- Formulação WG de elevada qualidade.

CULTURA	DOSE (kg/ha)	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO
CEREAIS DE INVERNO E PRIMAVERA (Trigo Duro e Trigo Mole, Cevada, Triticale e Centeio)	0,15-0,2	Efetuar a aplicação entre as três folhas verdadeiras e o fim do afilhamento do cereal (BBCH 13-29) e as infestantes nos primeiros estádios de desenvolvimento. Culturas Seguintes: se pretender semear colza depois da colheita dos cereais deve efetuar uma mobilização de 10 a 15 cm de profundidade. Culturas de Substituição: Em caso de perda da cultura pode cultivar ervilhas, feijão, girassol e cereais de primavera.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Amor-de-hortelão (*Galium aparine*), Anthemis spp., Azevém (*Lolium multiflorum*), Cabelo-de-cão (*Poa annua*), Labaça-crespa (*Rumex crispus*), Margaças (*Matricaria chamomilla*), Morrião (*Anagallis arvensis*), Morugem (*Stellaria media*), Mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), Papoila-das-searas (*Papaver rhoeas*), Raspa-saias (*Picris echioides*), Veronica-de-folhas-de-hera (*Veronica hederifolia*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Rabo-de-raposa (*Alopecurus sp.*), Balanco (*Avena fatua*), Erva-febra (*Lolium rigidum*), Corriola (*Convolvulus arvensis*), Miosotis (*Myosotis arvensis*).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A mistura de herbicidas com diferentes modos de ação é uma estratégia recomendada.
- Volume de calda: 200 a 400 L/ha.
- Evitar deixar a calda em repouso.
- Recomenda-se proceder à rotação de culturas, sempre que possível.
- Não aplicar o Kacik® mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendadas especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura..