

# Herbicida

# Fuego®

Herbicida de contacto e residual

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Concentrado para emulsão(EC) c/ 22,3% (p/p) ou 240 g/L de oxifluorfená

Família química: Difeniléter

Número de AV: 1228

Classificação ADR: 1993, 9, III

Embalagem: 1 L, 5 L e 20 L



PERIGO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- FUEGO® é um herbicida de contacto com ação residual.
- O produto é absorvido pelos órgãos aéreos (hipocótilo, epicótilo, tecidos meristemáticos foliares e folhas) da infestante.
- FUEGO® controla infestantes anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas.

## OBSERVAÇÕES

- Em **pré-emergência**, exerce a sua ação residual através da criação de uma película à superfície do solo. As infestantes que tentarem germinar contactam com essa película, acabando por morrer.
- Em **pós-emergência**, atua por contacto direto sobre as jovens plântulas das infestantes.
- Os melhores resultados são obtidos quando, no momento da aplicação, as infestantes presentes se encontram no estado das 2-4 folhas (em pós-emergência).
  - No caso das infestantes mais desenvolvidas recomenda-se a mistura com MONTANA® ASCENZA.



ASCENZA®

### INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Beldroega (*Portulaca oleracea*), bolsa-de-pastor (*Capsella rubella*), bredos (*Amaranthus* spp.), catassol (*Chenopodium album*), dente-de-leão (*Taraxacum officinale*) erva-moira (*Solanum nigrum*), erva-moleirinha (*Fumaria officinalis*), grizandra (*Diplotaxis catholica*), morrião (*Anagallis arvensis*), mostarda-dos-campos (*Sinapis arvensis*), nariz-de-zorra (*Silene gallica*), *Polygonum* spp., saramago (*Raphanus raphanistrum*), serralha-áspera (*Sonchus asper*), serralha-macia (*Sonchus oleraceus*), urtigas (*Urtica* spp.), urtiga-morta (*Mercurialis annua*), verónicas (*Veronica* spp.).

### INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Avoadinha (*Conyza canadensis*), bico-de-pomba-menor (*Geranium molle*), cabelo-de-cão (*Poa annua*), corriola (*Convolvulus arvensis*), erva-vaqueira (*Calendula arvensis*), junça (*Cyperus rotundus*), grama (*Cynodon dactylon*), lâmio (*Lamium amplexicaule*), malvas (*Malva sylvestris*), milhãs (*Digitaria* spp. e *Setaria* spp.), morugem-branca (*Stellaria media*), olha-de-mocho (*Tolpis barbata*) e tasneirinha (*Senecium vulgaris*).

### INFESTANTES RESISTENTES

Erva-garfo (*Erodium malacoides*), Língua-de-ovelha (*Plantago lanceolata*), *Chamaemelum mixtum*.

CULTURA	DOSE (L/ha)	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
CITRINOS E OLIVAL	0,6	Aplicar a partir do 1º ano de plantação, no fim do Outono ou da Primavera; aplicações dirigidas ao solo de modo a não atingir as partes verdes. Aplicar em bandas ocupando 1/3 do terreno.	21
MACIEIRA, PEREIRA E PESSEGUIRO	0,6	Aplicar a partir do 2º ano de plantação. Só pode ser aplicado durante o repouso vegetativo ou após o vingamento dos frutos; aplicação dirigida ao solo de modo a não atingir as partes verdes. Aplicar em bandas ocupando 1/3 do terreno.	180
VINHA	0,6	Aplicar a partir do 3º ano de plantação e durante o repouso vegetativo, até cerca de 1 mês antes da rebentação. Aplicar em bandas ocupando 1/3 do terreno.	180

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- No momento da aplicação o terreno deve estar bem preparado e com alguma humidade.
- Volume de calda a utilizar: 200-600 L/ha.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.