

Fungicida

Vitipec® Gold

Fungicida anti-míldio sistêmico de tripla ação

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água com 4% (p/p) de cimoxanil + 25% (p/p) de folpete + 50% (p/p) de fosetil-alumínio

Família química: Acetamida, N-tiotrihalometilo (fralimida) e organometálico com alumínio

Número de APV: 1787

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 300 g e 5 kg



Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais: H317, H319, H351, H361fd, H410, P102, P201, P202, P261, P270, P280, P305+P3051+P338, P308+P313, P362+P364, P405, P501, P391, EUH210, EUH401, SP1, SPe3, SPe3PT3, SPoPT2, SPoPT4, SPoPT5, SPoPT6, SPoPT7

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **VITYPEC® GOLD** é um fungicida sistêmico, com ação preventiva, curativa e anti-esporulante sobre o míldio da videira.

É composto por três s.a.:

- Folpete, com ação de contacto, protegendo a planta à superfície contra novas infeções
 - Cimoxanil, fungicida penetrante que reforça e completa a atividade curativa do fosetil-alumínio, impedindo a esporulação do fungo;
 - Fosetil-alumínio, s.a. com sistememia completa (ascendente e descendente).
- **VITYPEC® GOLD** é absorvido pelas plantas cerca de 30mn após a sua aplicação, ficando ao abrigo da chuva. Promove uma proteção eficaz dos novos lançamentos formados entre dois tratamentos e tem uma persistência de ação de 12-14 dias

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA (UVAS PARA VINIFICAÇÃO)	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	300	3	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência iniciar os tratamentos, logo após o aparecimento dos primeiros focos na região ou a partir das 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes, deverão ser realizados enquanto as condições meteorológicas favorecerem o desenvolvimento da doença. A persistência biológica é de 14 dias; reduzir para 12 nos períodos de maior crescimento da planta.	42

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Realizar as aplicações sempre com carácter preventivo.
- Recomenda-se a utilização de **VITIEC® GOLD** entre o estado de 7-8 folhas até ao final da floração. Neste período a planta está em ativo crescimento e o triplo modo de ação do produto permite uma proteção completa, nomeadamente em regiões ou anos em que a pressão do míldio seja intensa.
- **VITIEC® GOLD** não afeta a fermentação nem as características organolépticas dos vinhos.
- **VITIEC® GOLD** é incompatível com adubos foliares e produtos à base de cobre, dinocape e óleo mineral.
- As concentrações indicadas referem-se a pulverizações em alto volume. Quando a aplicação se faz com aparelhos de médio ou baixo volume (turbinas ou atomizadores), a concentração deve ser aumentada por forma a que a dose de produto por hectare seja a mesma que no alto volume.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

