

Herbicida

Plaza®

Herbicida sistêmico

Tipo de produto: Herbicida

Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) c/ 25% (p/p) de rinsulfurão

Família química: Sulfonilureias

Número de AV: 1252

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 100 g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- PLAZA® é um herbicida sistêmico com reduzida ação residual.
- O produto é absorvido foliarmente e transportado até aos tecidos meristemáticos, onde irá atuar.
- PLAZA® é indicado para o controlo de infestantes gramíneas e algumas dicotiledóneas, em pós-emergência.

OBSERVAÇÕES

- Para melhorar a eficácia do PLAZA® adicionar o TREND® 90 a 0,1% ou outro adjuvante não iónico, pois facilita a absorção e penetração do produto através da cutícula das folhas.
- Os sintomas visíveis aparecem ao fim de 15-20 dias após a aplicação.

ASCENZA®

CULTURA	Nº APLICAÇÕES	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
MILHO	1	50 g/ha 1ª aplicação: 30 g/ha	Uma aplicação - Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 2 e as 4 folhas (BBCH 12-14). Ou Duas aplicações - Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 2 e as 4 folhas (BBCH 12-14). Entre a 1ª e a 2ª aplicação devem decorrer 8-15 dias.
	2	2ª aplicação: 20 g/ha	
BATATEIRA	1	60 g/ha 1ª aplicação: 60 g/ha	Uma aplicação - Aplicar em pós-emergência da cultura, desde a formação dos rebentos laterais basais até ao alongamento do tronco principal (BBCH 20-30). Entre a 1ª e a 2ª aplicação devem decorrer 8-15 dias. Ou Duas aplicações - Aplicar em pós-emergência da cultura, desde a formação dos rebentos laterais basais até ao alongamento do tronco principal (BBCH 20-30). Entre a 1ª e a 2ª aplicação devem decorrer 8-15 dias.
	2	2ª aplicação: 30 g/ha	
TOMATEIRO	1	60 g/ha 1ª aplicação: 60 g/ha	Uma aplicação - Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 3 e as 8 folhas (BBCH 13-18). Ou Duas aplicações - Aplicar em pós-emergência da cultura, entre as 3 e as 8 folhas (BBCH 13-18). Entre a 1ª e a 2ª aplicação devem decorrer 8-15 dias.
	2	2ª aplicação: 50 g/ha	

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Cabelo-de-cão (*Poa annua*), grama-francesa (*Elytrigia repens*), milhã-pé-de-galo (*Echinochloa crus-galli*), moncos-de-perú (*Amaranthus retroflexus*), morugem (*Stellaria media*).

INFESTANTES MODERADAMENTE SUSCETÍVEIS

Catassol (*Chenopodium album*), erva-moira (*Solanum nigrum*), erva-pessegueira (*Polygonum persicaria*), camomila (*Matricaria camomilla*), soagem (*Echium plantagineum*), beldroega (*Portulaca oleracea*).

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Não usar em milho doce ou em campos de multiplicação, nem em batateira destinada à produção de semente.
- O **PLAZA®** não deve ser usado em campos de milho ou de tomate previamente tratados com inseticidas organofosforados sistêmicos, nem com estes deve ser efetuada qualquer mistura.
- Recomenda-se não efetuar qualquer rega até 72 horas depois da aplicação do **PLAZA®**.
- Evitar as misturas de **PLAZA®** com herbicidas que tenham na sua composição bentazona ou 2,4-D.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.