

# Inseticida

# Blade®

Inseticida regulador de crescimento

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Concentrado para emulsão (EC) c/ 11% (p/p) ou 100 g/L de piriproxifena

Família química: Derivado de piridina

Número de AV: 0500

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 1 L e 5 L



PERIGO

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **BLADE®** é um regulador de crescimento de insetos que atua por contato e ingestão
- Interfere na metamorfose, como mimético da hormona juvenil dos insetos
- Apresenta boa persistência de ação e está indicado para o controle de Cochinilha de São José nas culturas de macieira e pereira
- Deve ser aplicado na presença de ninfas do 1º instar da 1ª geração, para maximização da sua ação
- Apresenta um movimento translaminar

## OBSERVAÇÕES

- Uma vez que se trata de um produto que atua por contato e ingestão é fundamental que se realizem aplicações que cubram uniformemente todo o alvo a tratar

CULTURA	DOENÇA	CONC. (mL/hL)	DOSE (L/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
MACIEIRA E PEREIRA	Cochonilha de S. José	28 - 50	0,28 - 0,5	Realizar apenas uma aplicação, em pré-floração da cultura. BLADE deverá ser aplicado na presença de ninfas do primeiro instar da primeira geração	-
CITRINOS (laranjeira, limoeiro, lima, toranjeira, pomelo e tangerineira)	Cochonilha Pinta-vermelha; Cochonilha Virgula; Cochonilha Branca; Cochonilha da Raiz ou Parlatória	50 - 75	0,5 - 1,125	Realizar apenas uma aplicação de Maio a Junho. BLADE deverá ser aplicado quando se verifique a máxima presença de ninfas do primeiro instar da primeira geração para que se consiga uma eficácia aceitável ao longo do ciclo cultural	30
PESSEGUEIRO E NECTARINA	Cochonilha de S. José	40 - 50	0,28 - 0,5	Realizar apenas uma aplicação em pré-floração da cultura	-
AMEIXEIRA, CEREJEIRA, DAMASQUEIRO, GINJEIRA, AMENDOIRA	Cochonilha de S. José	40 - 50	0,28 - 0,5	Realizar apenas uma aplicação em pré-floração da cultura	-
TOMATEIRO (estufa)	Mosca-branca	50 - 75	0,5 - 1,125	Realizar até duas aplicações por campanha, com 10 dias de intervalo, iniciando as aplicações ao aparecimento da praga	3

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para evitar o desenvolvimento de resistência, efetuar no máximo uma aplicação por campanha durante a primeira geração das cochonilhas. Em caso de necessidade de novo tratamento, utilizar produtos com diferentes modos de ação
- Volume de calda - 1000 L/ha
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 20 metros em macieira e pereira. Sempre que possível, utilizar bicos anti-deriva que garantam, pelo menos, 50% de redução no arrastamento da calda durante a aplicação do produto podendo, nesse caso, reduzir a largura da zona não pulverizada para 15 metros
- Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura