

Fungicida

Tágide®

Fungicida de contato e translaminar

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Suspensão concentrada (SC) com 400 g/L ou 38,98% (p/p) de dodina

Família química: Guanidinas

Número de AV: 2275

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 10L



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- TÁGIDE® é um fungicida à base de dodina, pertencendo ao grupo químico das guanidinas.
- Possui atividade preventiva, assim como curativa, quando aplicado no início da infecção (18 a 24 horas após a contaminação).

CULTURA	DOENÇA	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
MACIEIRA E PEREIRA	Pedrado (<i>Venturia inaequalis</i>) e (<i>Venturia pyrina</i>)	uma única aplicação de 2 L/ha ou duas aplicações de 1,6 L/ha	Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos preventivamente, antes da floração entre o intumescimento dos gomos florais e as flores fechadas (BBCH 53-59). O produto possui uma persistência de ação de 8 a 12 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistência realizar no máximo 2 tratamentos, por campanha, com este ou outro produto que contenha dodina. As aplicações devem ser espaçadas no mínimo de 8 a 12 dias.	60
PESSEGUEIRO E NECTARINA	Lepra (<i>Taphrina deformans</i>)	uma única aplicação de 2 L/ha ou duas aplicações de 1,6 L/ha	Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos preventivamente, desde o intumescimento dos gomos até à queda das pétalas (BBCH 69). O produto possui uma persistência de ação de 8 a 12 dias. Para evitar o desenvolvimento de resistência realizar no máximo 2 tratamentos, por campanha, com este ou outro produto que contenha dodina. As aplicações devem ser espaçadas no mínimo de 8 a 12 dias.	75
OLIVEIRA	Olho de pavão (<i>Fusicladium oleagineum</i>)	uma única aplicação de 2 L/ha ou duas aplicações de 1,6 L/ha	Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na sua ausência, realizar os tratamentos preventivamente, ao aparecimento da doença e, em condições climáticas favoráveis. Utilizar este produto apenas em tratamentos de Primavera (BBCH 31-69). O produto confere proteção durante 1 a 2 semanas. Se as condições climáticas se mantiverem favoráveis à doença deverá tratar novamente, alternando o uso deste produto com outros de diferentes modos de ação. Para evitar o desenvolvimento de resistência realizar no máximo 2 tratamentos, por campanha, com este ou outro produto que contenha dodina. As aplicações devem ser espaçadas no mínimo de 7 a 14 dias.	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para evitar o desenvolvimento de resistência, realizar no máximo 2 tratamentos, por cultura e campanha, com este ou outro produto que contenha dodina. Alternar o uso deste produto com outros de diferentes modos de ação.
- Com o tempo frio (abaixo de 5°C) ou em condições ligeiramente secas, não tratar macieiras e pereiras durante a floração ou imediatamente depois da queda das pétalas.
- Não aplicar em pereiras da variedade Conference.
- As formulações à base de dodina não são compatíveis com óleos parafínicos e com a maioria das formulações de cobre.
- Volumes de calda recomendados: 500 a 1000 L/ha.