

Fungicida

Calda Bordalesa Ascenza

Fungicida cúprico preventivo

Tipo de produto: Fungicida

Composição: Pó molhável (WP) c/ 20% (p/p) de cobre (sob a forma de sulfato de cobre e cálcio)

Família química: Inorgânico-cobre

Número de AV: 2232

Classificação ADR: 3077, 9, III

Embalagem: 500 g e 25 kg



PERIGO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- CALDA BORDALESA ASCENZA, é um fungicida cúprico à base de sulfato de cobre previamente neutralizado com cal.
- Atua de forma preventiva, pelo que os tratamentos devem ser realizados antes da cultura ser atacada.

OBSERVAÇÕES

- Se aplicado com tempo frio e chuvoso pode provocar fitotoxicidade. Nunca aplicar durante a floração se esta decorrer com tempo frio e chuvoso.
- Produto utilizável em Modo de Produção Biológico, de acordo com a legislação.
- Seguir as recomendações de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas.
- Evitar deixar a calda em repouso.



ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	CONC. (kg/hL)	DOSE (kg/ha)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA	Míldio	0,6 - 1,0	máx. 6,25	O produto possui uma persistência de 7 a 10 dias. Realizar no máximo 3 aplicações por campanha. Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano. Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na falta deste iniciar os tratamentos imediatamente após o aparecimento dos primeiros focos na região. Na sua ausência realizar o primeiro tratamento no estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da doença.	21
TOMATEIRO (AR LIVRE E ESTUFA)	Míldio	0,6 - 1,0	máx. 6,25	Realizar aplicações no viveiro e imediatamente após a transplantação quando o tempo decorar chuvoso.	3 dias em Tomateiro em estufa; 3 dias consumo em fresco; 10 dias para transformação industrial em tomateiro de ar livre
BATATEIRA	Míldio	0,6 - 1,0	máx. 6,25	Os tratamentos deverão realizar-se quando o tempo decorar chuvoso.	15
OLIVEIRA	Gafa e Olho-de-pavão	0,6 - 1,0	máx. 6,25	Realizar no máximo 2 aplicações por campanha. Aplicar no máximo 4 Kg de cobre/ha/ano. Realizar o primeiro tratamento antes da queda das primeiras chuvas outonais. Se as condições climáticas decorrerem favoráveis ao desenvolvimento da doença, repetir os tratamentos passadas cerca de três semanas.	15

ALARGAMENTO DE ESPECTRO PARA USOS MENORES

CULTURA	DOENÇA	CONC. (g/hL)	ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO	IS (dias)
EUCALIPTO - VIVEIRO	Antracnose	500	Tratar em condições favoráveis à doença (máx. 3 aplicações).	-
KIWI	Bacteriose	1250	Tratar desde o fim da colheita até após a poda de Inverno (máx. 3 aplicações).	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- A eficácia e a eventual fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI). A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.