

Inseticida

Rikolto®

Inseticida de origem natural

Tipo de produto: Inseticida

Composição: Grânulos solúveis em água (SG) com 200 g/Kg ou 20,0 % (p/p) de acetamipride

Família química: Neocotinóides

Número de AV: 2295

Classificação ADR: 3082, 9, III

Embalagem: 25g e 250g



ATENÇÃO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **RIKOLTO®** é um inseticida sistémico que atua por contacto e ingestão. A sua atividade translaminar e sistémica garantem uma boa proteção da planta.
- **RIKOLTO®** é composto por acetamipride, pertencente ao grupo químico dos neocotinóides, que atua no sistema nervoso dos insetos, sendo um antagonista do recetor nicotínico da acetilcolina.

ASCENZA®

CULTURAS	INIMIGOS	ÉPOCAS DE APLICAÇÃO	DOSE (Kg/ha)
COLZA	Escaravelho-da-colza (<i>Brassicogethes aeneus</i>)	Tratar ao aparecimento da praga e antes do final da floração (BBCH <69).	0,20
AMEIXEIRA	Afideo-verde (<i>Myzus persicae</i>) Afideo-pardo-do-pessegueiro (<i>Brachycaudus schwarzi</i>)	Tratar no início do ataque e repetir se necessário, os tratamentos deverão ser efetuados antes da floração (BBCH <59) e, ou a partir da queda das pétalas (BBCH >69).	0,25
CEREJEIRA	Afideo-verde (<i>Myzus persicae</i>) Afideo-pardo-do-pessegueiro (<i>Brachycaudus schwarzi</i>)	Tratar no início do ataque e repetir se necessário, antes da floração (BBCH <59).	

Em colza fazer no máximo uma aplicação por campanha e em ameixeira e cerejeira fazer no máximo duas aplicações por campanha, com intervalo entre aplicações de 14 dias.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.