Fungicida

Allurion®

A sistemia que protege

Tipo de produto: Fungicida
Composição: Solução concentrada (SL) c/ 510 g/L ou 35,2% (p/p) de fosfonatos de potássio (expresso em ácido fosfónico)
Família química: fosfonatos
Número de AV: 2316
Classificação ADR: Não regulamentado para efeitos de transporte
Embalagens: 10 L

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **ALLURION®** é um fungicida sistémico, com base em fosfonato de potássio, substância ativa inorgânica, pertencente ao grupo químico dos fosfonatos.
- O fosfonato de potássio possui atividade preventiva, metaboliza-se em ácido fosfónico, que aumenta a síntese de fitoalexinas e estimula as defesas naturais das plantas, também possui uma reduzida ação sobre o patogénio, atuando no seu metabolismo fosfatado, mas é essencialmente preventivo.

ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
VIDEIRA (UVA DE MESA E UVA PARA VINIFICAÇÃO)	Míldio (*Plasmopara viticola*)	150-250 ml/hl	**Allurion®**: Utilizar apenas quando as videiras apresentam mais de 10 folhas expandidas. Prosseguir os tratamentos enquanto as condições dimáticas favorecerem o desenvolvimento da doença. Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste iniciar os tratamentos imediatamente após o aparecimento dos primeiros focos na região. A persistência biológica deste produto é de 10 a 14 dias. Efetuar no máximo 3 tratamentos com este produto e 4 no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	15
LARANJEIRA E TORANJEIRA, TANGERINEIRA (INCLUI CLEMENTINA E HIBRIDOS), LIMOEIRO, LIMA, LARANJEIRA--AZEDA, BERGAMOTA	Míldio (*Phytophthora* spp.)	150-250 ml/hl	**Allurion®**: Aplicar por pulverização no início do amadurecimento dos frutos, quando estes começam a mudar de cor. A persistência biológica deste produto é de 20 dias. Realizar no máximo 2 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura	15
PIMENTEIRO (ESTUFA)	Míldio (*Phytophthora capsici*)	150-250 ml/hl	**Allurion®**:: Utilizar em condições de fraco a moderado ataque de míldio com uma persistência de 10 a 14 dias. Aplicar por pulverização preventivamente, a partir do estado de plântula, quando as condições sejam favoráveis à doença. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura	15
TOMATEIRO E BERINGELA (ESTUFA)	Míldio (*Phytophthora infestans*)	150-250 ml/hl	Aplicar por pulverização preventivamente, a partir do estado de plântula, quando as condições sejam favoráveis à doença. **Allurion®**: tem uma persistência de 10 a 14 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	15
MORANGUEIRO (ESTUFA)	Míldio (*Phytophthora* spp.)	150-250 ml/hl	Aplicar por pulverização preventivamente, a partir do estado de plântula, quando as condições sejam favoráveis à doença. Utilizar este produto em condições de fraco a moderado ataque de míldio, com uma persistência de 10 a 14 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	7
AMORA-SILVESTRE, FRAMBOESA, GROSELHEIRA-NEGRA, GROSELHEIRA VERMELHA, GROSELHEIRA-ESPIM, MIRTILO-AZUL (=ARANDO-AZUL), MIRTILO-VERMELHO (=ARANDO-VERMELHO) AR LIVRE	Míldio (*Phytophthora* spp.)	150-250 ml/hl	Aplicar por pulverização preventivamente, a partir do estado de plântula, quando as condições sejam favoráveis à doença. Utilizar este produto em condições de fraco a moderado ataque de míldio, com uma persistência de 10 a 14 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	7
ALFACE	Míldio (*Bremia lactucae*)	150-250 ml/hl	Aplicar por pulverização preventivamente, a partir do estado de plântula, quando as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença, com uma persistência de 10 a 12 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	15
DIOSPIREIRO	Alternariose (*Alternaria* sp.)	150-250 ml/hl	Aplicar por pulverização preventivamente, a partir do estado de plântula, quando as condições sejam favoráveis ao desenvolvimento da doença, com uma persistência de 15 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	20

ASCENZA®

CULTURA	DOENÇA	DOSE	ÉPOCA E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO	IS (dias)
ANANASEIRO	Podridão do colo e das raízes (*Phytophthora cinnamomi; Phytophthoran icotianae var. parasitica*)	150 ml/hl, não ultrapassando a dose máxima de 6 L/ha	Aplicar em pré-plantação, por imersão numa calda fungicida, com a concentração de 150 mL/hL. Um mês após a plantação realizar uma pulverização foliar, com a concentração de 150mL/hL e um volume de calda de 3000-4000 L/ha, o que equivale a máximo de 6 L/ha. Realizar no máximo 2 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	30
OLIVEIRA AZEITONA DE MESA E PARA AZEITE	Olho-de-pavão (*Fusicladium oleagineum*)	Usar na concentração de 150 a 250 ml/hl, a uma dose de 1,2 a 2,5 L/ha.	Fazer um tratamento no Outono/Inverno e 2 tratamentos na Primavera (BBCH 11-81). Este produto tem uma persistência biológica de 10-14 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	15
ABACATEIRO	Podridão-das-raízes (*Phytophthora cinnamomi*)	Usar na concentração de 150 a 250 ml/hl, não ultrapassando a dose máxima de 3,75 L/ha	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes, iniciar os tratamentos entre os cachos visíveis até ao pintor. (BBCH 53-83) Realizar no máximo 3 tratamentos com este ou outro produto com o mesmo modo de ação.	15
BATATEIRA	Mildio (*Phytophthora Infestans*)	Usar na concentração de 150 a 250 ml/hl, não ultrapassando a dose máxima de 2,5 L/ha.	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes, iniciar os tratamentos entre os cachos visíveis até ao pintor. (BBCH 53-83) Realizar no máximo 3 tratamentos com este ou outro produto com o mesmo modo de ação.	15
MACIEIRA, MARMELEIRO, NESPEREIRA, NESPEREIRA-DA--EUROPA	Pedrado (*Venturia inaequalis*)	Usar na concentração de 250 mL/hL, não ultrapassando a dose máxima de 2,5 L/ha.	Tratar de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta destes iniciar os tratamentos desde o final da floração e prosseguir enquanto as condições forem favoráveis à doença. (BBCH 69-81). A persistência de ação do produto é de 5 a 10 dias. Realizar no máximo 3 tratamentos com este produto e no total dos fungicidas com fosetil, fosfonato de potássio ou fosfonato de dissódio, autorizados para a cultura.	35
PEREIRA	Pedrado (*Venturia pyrina*)			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- O produto não é compatível com fertilizantes azotados (nítricos e amoniacais).
- Não se recomenda efetuar misturas de **ALLURION®** com óleos, porque dificulta a penetração do produto nas plantas.
- Não usar o produto em ananaseiros cuja produção se destine a processamento industrial.
- Consultar a indústria transformadora antes de usar o produto em morangueiro, quando a produção se destine a processamento industrial.
- Para mais informações consulte a Ficha de Dados de Segurança do produto.
- Os produtos fitofarmacêuticos (PFF) homologados em Portugal podem ser utilizados em proteção integrada (PI), não existindo uma lista de PFF's recomendados especificamente para esse efeito. A escolha do PFF deve ter, obrigatoriamente, em consideração a aplicação dos princípios gerais da PI e as normas definidas para a cultura.

Edição: FT ALL - 06/25 (AS) A-F - Leia sempre o rótulo da embalagem, siga as instruções de uso e esteja atento às frases e símbolos constantes do mesmo.

ASCENZA®